



Yevac NBE

Triple Inactivated Vaccine of Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Egg Drop Syndrome

Product name

Triple Inactivated Vaccine of Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Egg Drop Syndrome

Trade Name

Yevac NBE

Composition The virus content before inactivation, is more than $10^{8.5}$ EID₅₀/0.1 ml for ND La Sota Strain, $10^{7.0}$ EID₅₀/0.1ml for IB M41 strain, and EDS NE4 strain HA titer is more than 1:8192.

Physical Properties Milky white emulsion.

Indication It is used to prevent chicken Newcastle Disease, Infectious Bronchitis and Egg Drop Syndrome in chicken layer. Immunity appears 21 days post vaccination.

Application and Dosage Subcutaneous injection in neck or intramuscular injection in chest, 0.5 ml/bird, vaccinated 14-28 days before onset of laying

Abnormal Reaction Generally no abnormal reactions.

Precautions

- (1) The product cannot be used on infected or unhealthy birds.
- (2) The vaccine should be carefully examined, and not allowed to use if breakage, or extraneous material is noticed.
- (3) The product should be prewarmed to room temperature, and well shaken before use.
- (4) The vaccine should be used up to within 12 hours after uncapping.
- (5) The product cannot be frozen.
- (6) The injection tools should be disinfected before use, and the injection site should be disinfected with 5% iodine tincture.
- (7) The used bottles, remaining vaccine and utensil shall go through non-harmful disposal.

Specification 500 ml/bottle.

Pakage 20 bottles/box.

Storage and shelf life 2-8°C, 24 months.

FOR VETERINARY USE ONLY

Follow the Guidance
of Veterinarian



نام محصول: واکسن کشته سه گانه علیه بیماری های نیوکاسل، برونشیت عفونی، سندرم افت تخم مرغ.

نام تجاری: Yevac NBE

ترکیب: میزان ویروس ها قبل از غیرفعال سازی: بیشتر از $10^{8.5}$ EID₅₀ در ۰/۱ میلی لیتر برای سویه لاسوتا نیوکاسل، $10^{7.0}$ EID₅₀ در ۰/۱ میلی لیتر برای سویه M41 برونشیت عفونی و میزان ۱:۸۱۹۲ تیترا HI برای سویه NE4 ویروس عامل سندرم افت تخم مرغ.

شکل ظاهری: امولسیون سفید شیری.

موارد استفاده: به منظور پیشگیری از بروز بیماری های نیوکاسل، برونشیت عفونی و سندرم افت تخم مرغ در گله های مادر و تخم گذار. ایمنی حاصله معمولاً ۲۱ روز پس از واکسیناسیون به میزان مد نظر می رسد.

روش استفاده و دوز مصرفی: تزریق زیرپوستی در ناحیه گردن یا تزریق عضلانی در سینه.

* میزان ۰/۵ میلی لیتر به ازای هر پرنده.

زمان استفاده بسته به نظر دامپزشک، معمولاً ۱۴ تا ۲۸ روز قبل از شروع تخم گذاری (در دوره تولید نیز می توان از واکسن استفاده کرد، با این حال بهتر است در دوره اوج تولید با توجه به استرس های ناشی از واکسیناسیون استفاده نشود).

اثرات نامطلوب: معمولاً اثرات نامطلوبی وجود ندارد.

موارد احتیاط:

۱. واکسن را در گله های بیمار مصرف نکنید.

۲. از مصرف واکسن با بطری های آسیب دیده، دارای آلودگی و یا با امولسیون غیرنرمال خودداری کنید.

۳. قبل از مصرف اجازه دهید واکسن به دمای اتاق برسد و به خوبی آن را تکان دهید.

۴. پس از باز کردن محصول بهتر است نهایتاً تا ۱۲ ساعت مصرف شود.

۵. از یخ زدن واکسن جلوگیری شود.

۶. وسایل مورد استفاده برای تزریق قبل از مصرف باید ضدعفونی شود. بهتر است محل تزریق با تانتور ید ۵ درصد ضدعفونی شود.

۷. بعد از واکسیناسیون تمامی متربال باقی مانده شامل بطری های واکسن، وسایل استفاده شده ی دورریختنی و بطری هایی که باز شده و تمام نشده اند، باید استریل شده و مطابق قوانین محلی معدوم گردند.

بسته بندی: بطری های ۵۰۰ میلی لیتری. ۲۰ بطری در هر جعبه.

نگهداری و بهترین زمان مصرف: در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتی گراد، ۲۴ ماه.



یو ک ان بی ای

واکسن کشته سه گانه علیه بیماری های
نیوکاسل، برونشیت، سندرم افت تخم مرغ



شیمی داروی پارسیان
Shimi Darou Parsian Co.

پخش سراسری:

شرکت شیمی داروی پارسیان

۲۷۶۱۶۰۰۰



صرفاً مصرف دامپزشکی دارد.
تحت نظارت سازمان دامپزشکی.
مطابق دستور دامپزشک مصرف شود.

نماینده در ایران و وارد کننده: شرکت سلامت دیافارم
آدرس دفتر مرکزی: تهران، خیابان مطهری، خیابان میرزای شیرازی،
خیابان ناهید، پلاک ۲۶ تلفن: ۸۸۷۱۵۴۶۷-۸۸۷۰۵۴۲۱